





تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster
شركة الصحة القابضة



صلة شريانيه لانسداد الشريان
الأورطي (في البطن والحوض)
**Surgical Bypass for
Aortoiliac Occlusive Disease**



الوصلة الجراحية ليست علاجًا لمرض انسداد الشريان الأورطي في البطن والحوض. إنه علاج يُعطى لتحويل تدفق الدم حول الشريان المصاب لزيادة تدفق الدم إلى ساقيك عندما لا تنجح العلاجات أو التدخلات غير الجراحية مثل التوسيع عن طريق القسطرة بالبالون ووضع الدعامات، أو عندما لا تكون مناسبة لك.

لماذا يتم القيام به:

قد يكون هناك حاجة لعمل وصلة الشريان الأورطي في البطن والحوض إذا كنت تعاني من انسدادات شديدة في الشريان الأورطي أو الشرايين في الحوض، مما يسبب انزعاجًا شديدًا في ساقيك عند المشي. قد يكون الانسداد شديدًا لدرجة أن قدميك تؤلمك حتى عند عدم الحركة (ألم بدون جهد)، أو تحدث جروح في ساقيك بسبب نقص تدفق الدم.

الوصف:

- ❧ إن وصلة الشريان الأورطي الفخذي هي وضع وصلة تربط الشريان الأورطي وأحد شرايين الفخذ أو كلاهما في الحوض لتجاوز الشريان المسدود وزيادة تدفق الدم إلى ساقيك. يتم الوصول إلى الشريان الأورطي من خلال شق منتصف البطن. باستخدام غرز صغيرة، يتم خياطة الوصلة في مكانها فوق الانسداد الموجود في الشريان الأورطي وتحت الانسداد في الشريان الفخذي. ثم يتم إغلاق الأنسجة في طبقات فوق الوصلة في البطن والفخزين.
- ❧ قد يستمر الألم مكان الشق الجراحي لعدة أيام إلى بضعة أسابيع بعد الإجراء. سيقدم فريق الجراحة لك كميات كافية من أدوية الألم للحفاظ على راحتك.
- ❧ يختلف وقت الجراحة بشكل كبير، اعتمادًا على الوزن ومدى نسبة الانسداد.

المخاطر:

تشمل المضاعفات المحتملة لهذه العمليات:

✚ الإصابة بالسكتة القلبية.

✚ السكتة الدماغية.

✚ التهاب الجرح.

✚ التهاب في الوصلة.

✚ النزيف، قد تحتاج بسببه الى نقل دم.

✚ انسداد الوصلة وتوقف سريان الدم الى الأطراف السفلية

مما قد يزيد نسبة فقدان القدم/الطرف السفلي.

✚ الحاجة إلى عملية جراحية أخرى.

بعد وصلة الشريان الأورطي الفخذي:

🚫 تستطيع الاستحمام بعد العملية ب 5 أيام، مع التأكد من تجفيف جميع مناطق الجروح تمامًا.

🚫 يجب عدم النزول في حوض السباحة أو (البانيو) حتى تشفى جميع الجروح تمامًا - على الأقل أسبوعين من تاريخ الجراحة.

🚫 يجب عدم رفع أي شيء أثقل من 10 كيلو لعدة أسابيع، حتى تشفى الشقوق تمامًا.

🚫 عادة، يتم ترك الدبابيس على جرح البطن حتى التئامه، والتي يمكن إزالتها في غضون 2-3 أسابيع من قبل الطبيب

كيفية التحضير:

🚫 يتناول معظم المرضى الأسبرين بالإضافة إلى دواء الكوليستترول قبل الجراحة. اسأل جراح الأوعية الدموية الخاص بك إذا كنت بحاجة إلى ضبط أدوية أخرى.

🦋 سوف يُطلب منك الصيام (عدم تناول الطعام أو الشراب) بعد منتصف الليل قبل الجراحة.

🦋 إذا كنت تدخن، فتوقف لمساعدة الوصلة الجراحية على البقاء لفترة أطول وتعزيز شفاء الجروح.

ما الذي يمكنني توقعه بعد العملية؟

🦋 تُجرى هذه العمليات لتحسين تدفق الدم إلى ساقيك. في حال نجاحها، يجب أن تكون قادرًا على المشي لمسافات أطول أو أن يقل الألم في الساقين عما كان عليه قبل الجراحة. لن يتغير الألم في الساق ناتجًا عن حالات أخرى، مثل مشاكل الظهر أو ألم الأعصاب.

🦋 من المحتمل أن تشعر بالألم الشق لعدة أيام إلى بضعة أسابيع وتعالج بأدوية الألم.

لأن الوعي وقاية

إدارة التشخيص الصحي

مركز الملك سلمان لطب وجراحة القلب
وحدة جراحة الأوعية الدموية