




تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster
شركة الصحة القابضة



عملية إصلاح تضيق الشريان
السباتي

Carotid Endarterectomy

إصلاح تضيق الشريان السباتي هو إجراء جراحي لفتح أو تنظيف الشريان السباتي بهدف الوقاية من السكتة الدماغية. إنه إجراء دائم، ولكن ليس علاجًا؛ في نسبة قليلة من الناس، يمكن أن يتراكم التضيق مرة أخرى.

لماذا يتم القيام به:

قد يقترح جراح الأوعية الدموية عليك إجراء إصلاح تضيق الشريان السباتي إذا كنت تعاني من:

- **تضيق متوسط (50-79%)** في الشريان السباتي وتعاني من

أعراض مثل السكتة الدماغية أو نوبة نقص تروية القلب .

- **تضيق شديد (80% أو أكثر)** حتى لو لم تكن تعاني من أي أعراض.

الوصف:

- يُجرى إصلاح تضيق الشريان السباتي في غرفة عمليات جراحية معقمة. قد تمكث في المستشفى لمدة يوماً أو يومين بعد الإجراء اعتماداً على حالتك الطبية.
- العملية قد تكون تحت تخدير جزئي أو تخدير عام.
- يقوم الجراح بعمل شق جراحي طولي في الجزء الأمامي من الرقبة على الجزء اليميني أو اليسار على حسب مكان الشريان المتضيق.
- بعد إزالة الترسبات من الشريان، يقوم جراح الأوعية الدموية بإصلاح الشريان عن طريق خياطة رقعة على مكان فتحة الشريان للتقليل من نسبة تضيق الشريان مرة أخرى.
- وسوف يقوم الجراح بخياطة الجرح.

⚠️ المخاطر:

- سوف تكون نسبة حدوث السكتة الدماغية في 2-3% من المرضى الذين ليعانون من أعراض قبل العملية ؛ وتكون نسبة الحدوث 5-7% عند المرضى الذين يعانون من أعراض قبل الإجراء مثل السكتة الدماغية أو نقص تروية القلب. بعد العملية، سيُطلب منك تحريك ذراعيك وساقيك وفحصها من قبل الممرضات والأطباء للتأكد من عدم وجود أعراض جديدة للسكتة الدماغية.

- نوبة قلبية.

- ضرر للأعصاب، يؤثر على صوتك أو حركة لسانك أو الإحساس في منطقة الرقبة.

كيفية التحضير:

- مناقشة حالتك مع أفراد العائلة.

- اسأل طبيبك ما إذا كان يجب مواصلة أو تعديل الأدوية المجدولة.

ماذا يمكنني توقعه بعد العلاج؟

- ستبقى في المستشفى لمدة يوم أو بضعة أيام بعد العملية ، وقد تطول في حال ظهور مضاعفات، وفي هذه الحالة قد يكون هناك حاجة إلى البقاء في مركز للتأهيل.
- ستعاني من شعور حكة في الحلق بسبب أنبوب التنفس وسيتخذ الجلد المحيط بالشق الموجود في رقبتك. وهذا سوف يتحسن مع مرور الوقت.
- سوف تراجع مع طبيبك في العيادة وستقوم بإجراء أشعة بالموجات فوق الصوتية للشريان السباتي لفحص الشريان. سيتم القيام بذلك سنويًا للتأكد من عدم تراكم الترسبات مرة أخرى.
- وقد يطلب منك تناول أطعمة طرية وناعمة مثل الحساء والزيادي لفترة من الوقت قبل العودة إلى نظامك الغذائي الطبيعي.
- يُسمح عادةً بالقيادة بمجرد إيقاف مسكنات الألم ويمكنك بسهولة إدارة رأسك للتحقق من محيطك على الطريق والاندماج بأمان مع حركة المرور.

لأن الوعي وقاية

إدارة التثقيف الصحي

مركز الملك سلمان لطب وجراحة

القلب وحدة جراحة الأوعية الدموية

HEM1.24.0001684