




تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster
شركة الصحة القابضة



أنبوبة قسطرة مركزية
للغسيل الكلوي

Central Dialysis Catheter

تعتبر قسطرة غسيل الكلى أحد خيارات الوصول إلى غسيل الكلى للأشخاص الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى وقد لا يتمكنون من عمل وصلة بين الشريان والوريد (AV Fistula) أو عمل وصلة صناعية بين الشريان والوريد (AV Graft). يمكن استخدامها بمجرد التأكد من المكان الصحيح.

وفي بعض الأحيان يستخدم الأشخاص قسطرة غسيل الكلى مؤقتاً عند زراعة وصلة الشريان الوريدي حتى يتمكنون من استخدامها في الغسيل.

الوصف:

- يتم وضع القسطرة في غرفة عمليات معقمة.
- يتم وضع القسطرة المركزية في الرقبة وحول عظمة الترقوة ويكون مخرجها في الصدر.
- يتم وضع القسطرة في بعض الأحيان في الفخذ إذا كانت أوردت الصدر متضيقة أو مسدودة.



يستغرق الإجراء عادة حوالي 1-1.5 ساعة.

- عادة ما يتم إجراء اختبار الموجات فوق الصوتية لتحديد الوريد الأنسب.
- يتم تعقيم المنطقة المختارة للإجراء وسوف يتم اعطاء التخدير الموضعي للمكان المختار قبل إدخال القسطره لتقليل الإحساس بالألم.
- يتم استخدام إبرة صغيرة للدخول في الوريد. ثم يتم تمرير القسطرة وتوجيهها إلى الوريد.
- يتم التقاط صورة بالأشعة السينية للتأكد من وضع القسطرة الصحيح قبل تثبيتها في مكانها.

المخاطر:

تتضمن المضاعفات المحتملة من قسطرة الغسيل

الكلوي ما يلي:

- العدوى.
- نزيف في مكان القسطرة.
- دخول هواء حول الرئة مما يسبب ضغط على الرئة، والذي يمكن أن يحدث في وقت الإدخال.
- جلطة دموية (تخثر) تتشكل في القسطرة وتمنع أو تقلل من تدفق الدم.
- جلطة دموية (انسداد الوريد المركزي) يمكن أن تسد الأوعية الكبيرة في الصدر ويمكن أن تسبب تورم الصدر والرقبة.
- في كثير من الأحيان يمكن تصحيح ذلك عن طريق قسطرة الأوعية الدموية بالبالون عن طريق الوريد. يتم نفخ البالون ببطء داخل الجزء المسدود من الوريد لإعادة فتحه واستعادة تدفق الدم.

- في بعض الأحيان يتم استخدام أدوية " مذيبي الجلطات " التي تسمى أدوية علاج الخثرات مع قسطرة الأوعية الدموية بالبالون لتصحيح الانسداد.
- يمكن أن تلتوي القسطرة أو تتحرك من مكانها.

اتصل بطبيبك الخاص بك إذا ظهرت عليك أي من الأعراض

التالية:

○ درجة حرارتك أكثر من ٣٨,٦ درجة.

○ رجفة أو قشعريرة.

○ ألم في الصدر.

○ ضيق في التنفس.

○ نزيف من مكان القسطرة.



كيفية التحضير:

قد تحتاج إلى التوقف عن بعض الأدوية المضادة للتخثر قبل الإجراء.

ما يمكن توقعه بعد العلاج:

- ❖ قد تشعر ببعض الانزعاج في موقع القسطرة، ويجب أن يختفي هذا خلال بضعة أيام.
- ❖ من المهم الحفاظ على المنطقة المحيطة للقسطرة جافة ونظيفة.
- ❖ تجنب لمس القسطرة بشكل مباشر.
- ❖ إذا اضطررت للمس القسطرة بشكل مباشر يجب عليك غسل يديك قبل أن تلمسها.

لأن الوعي وقاية

إدارة التثقيف الصحي

مركز الملك سلمان لطب وجراحة القلب
وحدة جراحة الأوعية الدموية

HEM1.24.0001685

7