





تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster
شركة الصحة القابضة



عملية توصيل الشرايين

Surgical Peripheral Bypass



عملية توصيل الشرايين الطرفية عبارة عن وصلة

طبيعية أو صناعية، تعمل الوصلة الجراحية على

**توجيه تدفق الدم حول منطقة الانسداد الناتج عن مرض
تصلب الشرايين الطرفية. الجراحة لا تعالج المرض أو تزيل
الانسداد ولكن تساعد على زيادة تدفق الدم للأطراف
لتخفيف الألم ومساعدة التئام الجروح.**

مدة صلاحية الوصلة الجراحية:

يعتمد عمر الوصلة الجراحية على صحة الشرايين ونوع الوصلة المستخدمة (وصلة الأوردة الطبيعية تدوم لفترة أطول من الوصلة الصناعية) وعوامل صحية أخرى، مثل ما إذا كنت تدخن أو تعاني من مرض السكري أو الفشل الكلوي.

السبب في القيام بذلك:

قد تساعدك الوصلة الجراحية إذا كنت تعاني من مرض تصلب الشرايين وانسداداتها ولديك أعراض مثل ألم في عضلات الساق أثناء المشي (العرج)؛ ألم في الليل يوقظك من النوم، وخاصة في القدمين (ألم بدون مجهود)؛ تقرحات القدمين والساقين التي لا تشفى؛ والأنسجة الميتة (الغرغرينا).

🔥 عادة، يتم تجربة علاجات أخرى أولاً، مثل الأدوية وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين والعناية بالجروح. إذا فشلت هذه العلاجات ولم يكن العلاج البديل مثل قسطرة الأوعية الدموية بالبالون والدعامات مناسباً، فقد يتم إجراء اختبارات لتقييم إمكانيات إجراء وصلة جراحية.

الوصف:

🔥 سيتم إعطاؤك مخدرًا عامًا أو نصفى حتى لا تشعر بأي ألم أثناء العملية.

🔥 إذا لزم الأمر، سيتم نقل دم لك.

تستخدم الوصلة من الشريان الفخذي إلى الشريان تحت الركبة (-fem A pop bypass)، وهي النوع الأكثر شيوعًا، وصلة طبيعية أو صناعية لإنشاء انعطاف حول الانسداد بدءًا من ثنية الفخذ وينتهي أسفل الركبة من الجهة الداخلية، أو في بعض الأحيان الساق أو القدم.

يتم إجراء شق يبلغ طوله حوالي 5-10 سم عند ثنية الفخذ ومرة أخرى عند نقطة النهاية.

إذا تم استخدام الوريد الخاص بك لإنشاء الوصلة، فقد يتم إجراء شقوق صغيرة أخرى في الجزء الداخلي من الفخذ. بخلاف ذلك، سيتم استخدام وصلة صناعية مصنوعة من القماش (Dacron) أو البلاستيك.

يتم خياطة الوصلة في الشريان من كلا الطرفين بغرز دقيقة.

تستغرق العملية من ساعة ونصف إلى خمس ساعات.

المخاطر:

انسداد الوصلة بعد العملية مباشرة أو بعد سنوات. في بعض الأحيان يتم تصحيح هذا بواسطة عملية جراحية أخرى أو إجراء قسطرة، وفي بعض الأحيان بواسطة وصلة جديدة.

المضاعفات الأخرى المحتملة بعد الجراحة تشمل:




نوبة قلبية، حيث إن العديد من المرضى الذين يعانون من مرض تصلب الشريان يعانون أيضًا من أمراض القلب.



التهابات الجروح، على الرغم من إعطاء المضادات الحيوية قبل وبعد الجراحة للمساعدة في منع ذلك.



التهابات المثانة أو غيرها.



التهاب رئوي.

كيفية التحضير:

عند الموافقة على الجراحة.

إذا كنت تدخن، قم بالإقلاع عن التدخين في أقرب وقت ممكن للتقليل فرص العديد من المضاعفات.

إذا كان لديك امراض في القلب فقد يرغب جراح الأوعية الدموية في الحصول على موافقة دكتور القلب لإجراء العملية.

قد تحتاج إلى فحوصات دم، وتخطيط كهربائية للقلب، وأشعة سينية خاصة أو اختبار إجهاد للقلب.

قبل الجراحة بعدة أيام:

اتبع روتينك اليومي واحصل على الكثير من النوم.



سوف يُطلب منك الصيام (عدم تناول الطعام أو الشراب) بعد منتصف الليل قبل الجراحة.

اتبع بعناية التعليمات حول الأدوية يوم ما قبل الجراحة ويوم الجراحة.

ما الذي يمكن توقعه بعد العملية؟

- 🔥 ستكون في المستشفى لمدة 2-5 أيام للمراقبة والتعافي.
- 🔥 ستشعر بالألم أو عدم ارتياح في الشقوق لعدة أيام يعالج بواسطة أدوية الألم.
- 🔥 في بعض الأحيان قد يتوجب على المرضى الذهاب إلى مركز للتأهيل لبضعة أيام بعد مغادرة المستشفى لاستعادة القوة.
- 🔥 ستكون قادرًا على ركوب السيارة وصعود الدرج، لكنك ستحتاج إلى وقت للتعافي قبل القيادة أو القيام بأعمال شاقة. تعتمد المدة على حالتك ونوع الوصلة.
- 🔥 قد تفقد شهيتك لفترة من الوقت وتفقد بعض الوزن، ثم ستعود لطبيعتك تدريجياً.
- 🔥 في كثير من الأحيان، يوجد انتفاخ في الساق أو البطن، وخدر حول الجرح، وأنبوب تصريف من الشق. ستحصل على تعليمات حول كيفية علاج هذه الأعراض.
- 🔥 سوف تتحسن الآلام العضلية أثناء المشي.

سوف يتم اعطائك مواعيد زيارات متابعة مع جراح الأوعية الدموية 
الخاص بك لإجراء أشعة الموجات فوق الصوتية لمراقبة الوصلة
الجراحية.

لأن الوعي وقاية

إدارة التثقيف الصحي

مركز الملك سلمان لطب وجراحة القلب وحدة جراحة

HEM1.24.0001687