



تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster
شركة الصحة القابضة



برنامج التطعيم الوطني

**National Immunization
Program**



حديثي الولادة :

لقاح عصية كالميت غيران (BCG)

- يُعطى هذا اللقاح للوقاية من مرض السل .
- يتم حقنه تحت الجلد أو داخله .
- بعد اعطاء الحقنة ب أسبوع إلى ٦ أسابيع، قد تظهر نقطة صغيرة حمراء في مكان الحقن .
- قد تستغرق هذه النقطة ما يصل إلى ثلاثة أشهر حتى تشفى وقد تترك ندبة صغيرة وذلك امر طبيعي .
- يجب أن يكون وزن الطفل ٢ كيلو غرام وما فوق .
- لا يُنصح بإعطاء هذا اللقاح للأطفال الذين يعانون من كبت المناعة .

لقاح التهاب الكبد الفيروسي - ب

- يُعطى للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي- ب .
- يتم حقنه في عضلات الفخذ للأطفال الرضع .



عمر شهرين إلى 4 أشهر:

لقاح شلل الأطفال غير الفعّال (IPV)

يُعطى لحماية الأطفال الرُّضع من الإصابة بشلل الأطفال

اللقاح الثلاثي أو لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي (Dtap)

وهو لقاح يُعطى للأطفال الذين تقل أعمارهم عن (٧) سنوات لوقايتهم من ثلاثة أمراض مميتة تسببها البكتيريا وهي: الخناق والكزاز والسعال الديكي (الشاهوق)

لقاح التهاب الكبد الفيروسي- ب

يُعطى للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ب .

لقاح المستدمية النزلية النوع ب (Hip)

وهو لقاح يُعطى للوقاية من بكتيريا المستدمية النزلية النوع ب، وهي بكتيريا توجد عادةً في الجهاز التنفسي العلوي مثل القصبة الهوائية وآخر الفم والأنف

لقاح البكتيريا الرئوية المقتترنة (PCV13)

- يُعطى هذا اللقاح للحماية من ١٣ نوع من البكتيريا الرئوية.
- يُعطى هذا اللقاح لحماية الأطفال من التهاب السحايا.
- يتم حقنه في عضلات الفخذ للأطفال الرضع.

لقاح روتا

- يُعطى عن طريق الفم بمقدار ١.٥ مل .
- يستخدم للحماية من العدوى بفيروس روتا/الفيروس العجلى، والذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للإسهال الحاد عند الأطفال الصغار .
- وهو لقاح حي، ويُمنع اعطائه للأطفال الذين يعانون من نقص المناعة .



عمر 6 أشهر :

اللقاح الفموي لشلل الأطفال (OPV)

- يُعطى هذا اللقاح للوقاية من الإصابة بشلل الأطفال .
- وهو لقاح حي، ويمنع اعطائه للأطفال الذين يعانون من نقص المناعة .

لقاح شلل الأطفال غير الفعّال (IPV)

- يُعطى لحماية الأطفال الرُّضع من الإصابة بشلل الأطفال .

اللقاح الثلاثي أو لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي (Dtap)

- وهو لقاح يُعطى للأطفال الذين تقل أعمارهم عن (٧) سنوات لوقايتهم من ثلاثة أمراض مميتة تسببها البكتيريا وهي: الخناق والكزاز والسعال الديكي (الشاهوق)

لقاح التهاب الكبد الفيروسي- ب

يُعطى للوقاية من التهاب الكبد الفيروسي - ب .

لقاح المستدمية النزلية النوع ب (Hip)

وهو لقاح يُعطى للوقاية من بكتيريا المستدمية النزلية النوع ب، وهي بكتيريا توجد عادةً في الجهاز التنفسي العلوي مثل القصبة الهوائية وآخر الفم والأنف .

لقاح البكتيريا الرئوية المقتترنة (PCV13)

- يُعطى هذا اللقاح للحماية من ١٣ نوع من بكتيريا المكورات الرئوية .
- يُعطى هذا اللقاح لحماية الأطفال من التهاب السحايا .
- يتم حقنه في عضلات الفخذ للأطفال الرضع .



عمر 9 أشهر:

لقاح الحصبة

• يؤخذ للوقاية من الإصابة بمرض الحصبة .

لقاح المكورات السحائية الرباعية المقترنة
(MCV4)

وهو لقاح يؤخذ لمنع العدوى الناجمة عن بكتيريا النيسرية
السحائية .



عمر 12 شهر (سنة)

اللقاح الفموي لشلل الأطفال (OPV)

- يُعطى هذا اللقاح للوقاية من الإصابة بشلل الأطفال .
- وهو لقاح حي، ويمنع اعطائه للأطفال الذين يعانون من نقص المناعة .

لقاح (MMR)

- ويُعطى هذا اللقاح للوقاية من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

لقاح البكتيريا الرئوية المقتترنة (PCV13)

- يُعطى هذا اللقاح للحماية من ١٣ نوع من البكتيريا الرئوية .
- يُعطى هذا اللقاح لحماية الأطفال من التهاب السحايا .

لقاح المكورات السحائية الرباعية المقتترنة (MCV4)

- وهو لقاح يؤخذ لمنع العدوى الناجمة عن بكتيريا النيسرية السحائية .



عمر 18 شهر (سنة ونصف)

اللقاح الفموي لشلل الأطفال (OPV)

- يُعطى هذا اللقاح للوقاية من الإصابة بشلل الأطفال .
- وهو لقاح حي، ويمنع اعطائه للأطفال الذين يعانون من نقص المناعة .

اللقاح الثلاثي أو لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي (Dtap)

- وهو لقاح يُعطى للأطفال الذين تقل أعمارهم عن (٧) سنوات لوقايتهم من ثلاثة أمراض مميتة تسببها البكتيريا وهي: الخناق والكزاز والسعال الديكي (الشاهوق) .

لقاح المستدمية النزلية النوع ب (Hip)

- وهو لقاح يُعطى للوقاية من بكتيريا المستدمية النزلية النوع ب، وهي بكتيريا توجد عادةً في الجهاز التنفسي العلوي مثل القصبة الهوائية وآخر الفم والأنف .

لقاح (MMR)

ويُعطى هذا اللقاح للوقاية من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

لقاح جدري الماء

يُعطى هذا اللقاح للوقاية من مرض جدري الماء، وهو شائع ويصيب الأطفال والمراهقين والشباب البالغين، أما الهربس النطاقي يكثر انتشاره بين البالغين، وبالنسبة للقوباء المنطقية تعتبر نادرة الحدوث عند الأطفال.

لقاح التهاب الكبد-أ

- هو لقاح غير نشيط .
- يُعطى للوقاية من الإصابة بفيروس الكبد - أ .
- في هذا العمر تؤخذ أول جرعة .



عمر 24 شهر (سنتين)

لقاح التهاب الكبد-أ

- في هذا العمر تؤخذ الجرعة الثانية بعد أخذها للمرة الأولى في عمر سنة ونصف .
- يجب أن يكون هناك مدة 6 أشهر بين الجرعة الأولى والثانية .
- هو لقاح غير نشيط .
- يُعطى للوقاية من الإصابة بفيروس الكبد – أ .



عند الالتحاق بالمدرسة

اللقاح الفموي لشلل الأطفال (OPV)

يُعطى هذا اللقاح للوقاية من الإصابة بشلل الأطفال وهو لقاح حي، ويمنع اعطائه للأطفال الذين يعانون من نقص المناعة .

اللقاح الثلاثي أو لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي (Dtap)

وهو لقاح يُعطى للأطفال الذين تقل أعمارهم عن (٧) سنوات لوقايتهم من ثلاثة أمراض مميتة تسببها البكتيريا وهي: الخناق والكزاز والسعال الديكي (الشاهوق) .

لقاح (MMR)

يُعطى هذا اللقاح للوقاية من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

لقاح جدري الماء

يُعطى هذا اللقاح للوقاية من مرض جدري الماء، وهو شائع ويصيب الأطفال والمراهقين والشباب البالغين أما الهربس النطاقي يكثر انتشاره بين البالغين، وبالنسبة للقوباء المنطقية تعتبر نادرة الحدوث عند الأطفال .

لأن الوعي وقاية

إدارة التثقيف الصحي

قسم تمريض العيادات الخارجية

HEM1.17.000540

R2-CCM-CPA/A.O.10924-NA