



تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster




داء الكَلَب

Rabies

ماهو داء الكَلَب؟

هو مرض فيروسي يصيب الثدييات بشكل عام وينتقل من الحيوانات المصابة عن طريق اللعاب إلى الأعصاب الطرفية للمصاب؛ وصولاً إلى الدبل الشوكي وأخيراً للدماغ، حيث تظهر الأعراض بعد شهر إلى ثلاثة أشهر بعد الإصابة.



أعراض داء الكَلَب:




العلاج:

لا يمكن علاج داء الكَلَب بشكل فعال؛ لذلك نركز على الوقاية سواء للبشر أو الحيوانات، وتكون بالتطعيمات المتوفرة وبمنع عض الحيوانات سواء بتدريبها من قبل المختصين أو وضعها بالمكان المناسب، مع التنبيه على ضرورة التنظيف الجيد للجرح حال حدوثه؛ لتقليل كمية الفيروس بداخل الجرح وبالتالي تقليل فرصة الإصابة.

التطعيم:

يعطى على عدة جرعات، باليوم الأول والثالث والسابع بعد العض، بالإضافة إلى الأجسام المضادة إذا كان الجرح عميقًا، أما لمن يعملون في تربية الحيوانات فالأفضل أخذها قبل حدوث أي عض بحيث أن تكون جرعتين، الفرق بينهما سبعة أيام.


التوصيات المتبعة للتطعيم ضد داء الكلب:



اضغط على الجرح لوقف
النزيف



اغسل الجرح تحت الماء
لمدة ١٠ دقائق



توجه للطبيب

التوصيات المتبعة للتطعيم ضد داء الكلب:

القطط والكلاب:

تقييم حالة الحيوان	الاجراءات المتبعة
حيوان سليم	التطعيم لايلزم؛ إلا إذا ظهرت أعراض على الحيوان
حيوان مصاب أو مشكوك بحالته الصحية	يجب التطعيم
حالة الحيوان الصحية غير معروفة	يقرر الطبيب؛ أو يتم أخذ رأي مسؤولي الصحة بالمنطقة

الحيوانات المفترسة:

تقييم حالة الحيوان	الاجراءات المتبعة
يعتبر الحيوان مصاب؛ إلا إذا تم فحصه والتأكد من سلامته	يتم التطعيم فوراً إلا إذا تم أخذ تحاليل للحيوان، ويجري العمل على تجهيزها

المواشي والخيول والإبل:

تقييم حالة الحيوان	الاجراءات المتبعة
يترك القرار للطبيب	يتم التواصل مع مسؤولي الصحة للاستعلام عن حالة الحيوان بالتنسيق مع وزارة الزراعة؛ حيث أن أكثر الحيوانات تحت الرقابة طبياً وتم تطعيمها

القوارض:

تقييم حالة الحيوان	الاجراءات المتبعة
يترك القرار للطبيب	يتم أخذ رأي مسؤولي الصحة بالمنطقة؛ وفي الغالب الأرانب والقوارض لا تستدعي التطعيم

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم طب الأسرة وصحة الموظفين



@Kfmc_Riyadh



King-fahad-medical-city



KfmcRiyadh



8001277000

HEM3.19.000670

