




تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster



حقن السيكونوماب

Secukinumab

ما هي حقن السيكونوماب؟

هي دواء على شكل قلم يحتوي على مادة (سيكونوماب) الفعالة، وهي عبارة عن أجسام مضادة تتكون من بروتينات تتعرف على بروتينات أخرى داخل جسم الإنسان، فترتبط البروتينات ببعضها وبالتالي توقف نشاط بعض البروتينات المسببة للأمراض المناعية ثم تثبط عملية الالتهاب في الجسم.

تستخدم حقن السيكونوماب لعلاج:

بعض أنواع التهاب
المفاصل

الصدفية
اللويحية

التهاب الفقار
الروماتويدي



ما المقصود بالصدفية اللويحية؟

عبارة عن بقع جلدية حمراء مغطاة بقشور تسبب الحكة، تظهر عادة على فروة الرأس وأسفل الظهر وعلى المرفقين والركبتين.

أسباب الصدفية اللويحية:

- خلل وظيفي بالجهاز المناعي.
- عوامل وراثية.
- التوتر.
- التدخين.

الجرعة الموصى بها في الصدفية اللويحية:

حقن ٣٠٠ ملجم تحت الجلد أسبوعياً لمدة ٣ أسابيع ثم مره كل شهر ابتداء من الأسبوع الرابع.

يمنع استخدام حقن السيكونوماب إذا



كنت:

١. مصابًا بالحساسية من هذا الدواء.
٢. مصابًا بعدوى مزمنة أو متكررة.
٣. مصابًا بمرض السل (الدرن).
٤. مصابًا بأمراض التهاب الأمعاء، مثل: مرض كرون أو التهاب القولون.
٥. تعاني من حساسية من مادة اللاتيكس.
٦. تستخدم أدوية أخرى للصدفية أو أدوية مثبتة للمناعة.
٧. تتعرض للعلاج الضوئي.
٨. حامل.

تجنب التطعيمات الحية أثناء العلاج. ❌

الآثار الجانبية:

١. الإصابة بأي عدوى خطيرة، مثل: الحمى والتعرق الليلي أو الشعور بتعب وضيق بالنفس أو السعال المستمر.
٢. إحمرار الجلد مع البثور.
٣. الشعور بالحرقنة عند التبول.
٤. صعوبة في البلع.
٥. الدوخة.
٦. تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.
٧. الإسهال.
٨. الهربس الفموي.



تعليمات ما قبل حقن السيكونوماب:

قبل حقن الدواء يجب فحص القلم لتأكد من
محتوى الدواء، أن يكون سائل ولونه بين عديم اللون
أو أصفر طفيف.

لا ترج القلم ولا تستخدمه إذا نزع منه الغطاء.


لا تستخدم القلم إذا كان ختم الأمان مكسوراً.

اختر مكان الحقن في الجزء الأمامي من الفخذين أو
أسفل البطن.

الرعاية الصحية يمكنهم حقن القلم في الجزء
الخارجي من الذراع.

طريقة تخزين حقن السيكونوماب:

١. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
٢. لا يستخدم الدواء بعد تاريخ إنتهاء الصلاحية.
٣. يحفظ في الثلاجة في درجة حرارة بين ٢-٨ درجة مئوية، ويجب استخدامه خلال نصف ساعة بعد إخراجهِ من الثلاجة.
٤. لا ترح القلم ولا تعرضه للتجميد.




طريقة أخذ حقن السيكونوماب:


١. اغسل يديك بالماء والصابون.
٢. عقم مكان الحقن بمسحة كحولية ثم اتركه يجف قبل حقن القلم.




٣. أزل غطاء القلم إذا كنت مستعد لحقن القلم، يجب استخدامه خلال ٥ دقائق من إزالة الغطاء.




٤. امسك القلم بزاوية قائمة ٩٠ درجة.



٥. ابدأ بعملية الحقن بضغط القلم على الجلد، وتدّل أول
نقرة للقلم على بدء الحقن، ثم يشير المؤشر
الأخضر إلى تطور الحقن.



٦. عندما تسمع النقرة الثانية للقلم فهذا يشير إلى
الإنهاء من عملية الحقن.



٧. تأكد من أن المؤشر الأخضر يملأ النافذة ثم يتوقف
مباشرة عن الحركة ثم قم بإزالة القلم.



٨. لا تقم باستخدام القلم مرة أخرى وتخلص منه في
حاوية النفايات الحادة.



ماذا نفعل بعد أخذ حقن السيكونوماب:

١. إجراء فحص دوري لمرض الدرن قبل وبعد أخذ الدواء.

٢. مراقبة العدوى أو أي أعراض تظهر على الجلد أو أعراض التهاب المناعي.



لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدلية الخارجية



King-fahad-medical-city



@Kfmc_Riyadh

You
Tube

KfmcRiyadh



8001277000

HEM1.20.0001134

