




تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster
شركة الصحة القابضة



أوكريليزوماب

Ocrelizumab

يُوصى باستعمال دواء أوكريليزوماب لعلاج المرضى
البالغين الذين يعانون من:
أشكال التصلب المتعدد الإنتكاسي (RMS)
التصلب المتعدد المترقّي الأولي (PRMS)


في حين أنه لا يوجد شخصان واجها نفس أعراض مرض
التصلب المتعدد، فإن العديد من الأشخاص مثلك قد
بدأوا رحلة علاجهم باستخدام علاج أوكريليزوماب. وكلما
عرفت عن حالتك وعلاجك بشكل أكثر، كان بإمكان فريق
الرعاية الصحية وأحبائك مساعدتك في عيش الحياة التي
تريد أن تعيشها.

ما هو مرض التصلب المتعدد؟

التصلب المتعدد هو مرض يؤثر على الجهاز العصبي المركزي (CNS) حيث تكون الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي في الشخص السليم مغلفة ببروتين عازل واقى يسمى الميالين. بينما في الأشخاص المصابين بمرض التصلب المتعدد، يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ عازل الميالين، مما يسبب ضررا للخلايا العصبية ويوقف الجهاز العصبي المركزي من العمل بشكل سليم

الخلايا المناعية في الدماغ:

في التصلب المتعدد، تنتقل الخلايا البائية والخلايا التائية إلى الدماغ حيث أنها لا يجب أن تتواجد هناك وتسبب أضرارا للميالين من خلال وسائط التهابية. ويؤدي الالتهاب الناجم عن هذه الخلايا إلى نسيج ندبي أو تصلب، الأمر الذي يعيق قدرة الخلايا العصبية على إرسال الإشارات التي تتحكم في الوظائف الحيوية والبدنية، كالتوازن والذاكرة والتناسق، مما يؤدي إلى أعراض التصلب المتعدد.



علامات وأعراض التصلب المتعدد:

يختلف مرض التصلب المتعدد وأعراضه من شخص لآخر. وقد يُظهر بعض الأشخاص علامات وأعراض المرض، في حين أن البعض الآخر الذين يعانون من مرض التصلب المتعدد لا يظهرون أي شيء.


ونظرًا لأن مرض التصلب المتعدد يُمكن أن يُؤثر على أي منطقة بالدماغ أو العصب البصري أو الحبل الشوكي، فإن مجموعة واسعة من الأعراض يمكن أن تنشأ. ويكون التصوير بالرنين المغناطيسي مفيدًا في الكشف عن الضرر في هذه المناطق، كما يمكن أن يساعد في تحديد مرض التصلب المتعدد حتى في حالة عدم ظهور الأعراض.

إِعلم أنه مع مرور الوقت، يُمكن أن تؤدي التكنولوجيا
والمعرفة المتزايدة بمرض التصلب المتعدد إلى علاجات
وأعدة جديدة التي من المحتمل أن تمنع أعراض التصلب
المتعدد.

قد يختلف مكان الأعراض من شخص لآخر. وقد يتم
اكتشاف بعض الأعراض فقط باستخدام معدات
تشخيص




قد تتضمن أعراض المرض ما يلي:



كيف يعمل أوكريزوماب:

يستهدف دواء أوكريزوماب خلايا بائية محددة قد يكون لها دور في مرض التصلب المتعدد ويزيلها

عندما يتم إزالة الخلايا البائية المستهدفة بواسطة علاج **أوكريزوماب**، تقل الالتهابات وتتضاءل فرصة إصابة الخلايا العصبية الأخرى وهذا يعني أنه يمكن تقليل عدد الانتكاسات في التصلب المتعدد الانتكاسي وإبطاء معدل التطور في التصلب المتعدد المترقي الأولي.



يستهدف علاج **أوكريزوماب** خلايا بائية

محددة ويزيلها مما يمنع إطلاق الأجسام

المضادة والوسائط الالتهابية

لا يستهدف دواء **أوكريزوماب** جميع الخلايا البائية

بجسمك بل يستهدف ويزيل خلايا بائية محددة قد

يكون لها دور في مرض التصلب المتعدد.

بعد إزالة الخلايا البائية المستهدفة

ينخفض تنشيط الخلايا التائية

يساعد الدواء على تخفيف انتكاسات وأعراض مرض التصلب المتعدد:

بالمقارنة مع أدوية أخرى، يساعد الدواء على:

دواء انترفيرون بيتا

- تقليل عدد الانتكاسات بنسبة 50%
- كبح تقدم المرض وتقليل احتمالية تفاقم العجز بنسبة 40%
- يزيد من فرصة وقف نشاط المرض لدى المرضى بنسبة 75%

الأدوية الوهمية

- تقليل تقدم العجز بحوالي الربع
- إبطاء تقدم المرض ويمنع التدهور في سرعة المشي

ابق دائماً على حوار مفتوح ومستمر مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك حيث يوجد العديد من العوامل التي قد تؤثر على كيفية عمل دواء أوكريليزوماب ومن المهم التحدث إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك قبل كل جرعة



قد يقرر طبيبك تأخير علاجك باستخدام دواء أوكريليزوماب
أو قد يقرر أنك لا تستطيع تلقي الدواء. ولمساعدة
طبيبك في تقرير ما إذا كان الدواء الأنسب لك، احرص
على إبلاغ طبيبك إذا:

كنت تعاني من مرض آخر يؤثر على جهاز المناعة. 

كنت مُصاب بعدوى. 

كنت تعاني من قبل من أي نوع من أنواع مرض الكبد
الوبائي النشط الذي يسمى التهاب الكبد ب أو حامل
لفيروس التهاب الكبد ب

كنت تعاني حاليًا من مرض السرطان أو إذا أُصبت به في
الماضي. 

تناولت أو تتناول أو تخطط لتناول أدوية تخدم أو تعدل جهاز 

المناعة - مثل العلاج الكيميائي أو مثبطات المناعة أو
الأدوية الأخرى المستخدمة لعلاج مرض التصلب المتعدد.

كنت تتناول أدوية لارتفاع ضغط الدم أو أي أدوية أخرى. 

تم إعطائك مؤخرًا أو ربما يتم إعطائك في المستقبل 

القريب، أي نوع من أنواع اللقاحات.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي مكون من مكونات هذا 

الدواء أو أي حساسية أخرى.

كنت حاملًا، أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملًا أو تخططين 

لإنجاب طفل.

ما يجب معرفته في يوم الجرعة:

قبل مغادرة المنزل

- تأكد من مقر أخذ الحقنة
- تأكد من ترتيب وسيلة النقل الخاصة بك

الوقت

- خصص 5 ساعات لأول جرعتين من الدواء و 6 ساعات لكل جرعة فيما بعد

كم أحتاج من الوقت لأخذ الجرعة؟

سوف تستغرق عملية الحقن نفسها حوالي ثلاث ساعات ونصف أو ساعتين ونصف إذا كانت الجرعة الأولية. ومع ذلك، فإن عملية العلاج بأكملها تتضمن عملية الإعداد وساعة على الأقل للمراقبة عند اكتمال الحقن. سيتم إعطائك العلاجات التحضيرية، على النحو الذي يحدده طبيبك، للمساعدة في ضمان سلامة علاجك وراحتك.

لمساعدتك على قضاء الوقت بشكل أسرع أحضر معك سماعات الرأس لمشاهد فيلم أو استمع إلى الموسيقى على هاتفك أو جهازك اللوحي

التفاعلات المتعلقة بالجرعة:

كما هو الحال مع كل دواء، قد يكون هناك آثار جانبية عند العلاج. في التجارب السريرية، كانت الآثار الجانبية المتعلقة بالحقنة الوريدية الأكثر شيوعاً مع دواء **أوكريليزوماب** وكانت معظم هذه التفاعلات تتراوح ما بين خفيفة إلى معتدلة، وكانت تحدث على الأرجح خلال الجرعة الأولى.

لذا سيتم مراقبتك خلال يوم الجرعة ولمدة ساعة واحدة على الأقل بعد إعطاء الجرعة. ويمكن أن تحدث التفاعلات المتعلقة بالجرعة خلال أخذ الجرعة أو حتى بعد 24 ساعة.

تشمل الآثار الجانبية:

أعراض نزلات برد

ألم في الظهر

الإسهال

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي تقع، إذا راودتك أي أسئلة عن الأعراض الجانبية اتصل بطبيبك، كما يمكنك الإبلاغ عن هذه الأعراض الجانبية.

يمكن علاج الآثار الجانبية

فريق الرعاية الصحية في موقع الحقن مدرب على بروتوكول لمساعدتك في حال حدوث الآثار الجانبية. وقد يُقرر الفريق إبطاء جرعتك أو إيقافها مؤقتًا إذا استمرت الأعراض

تابع رحلة العلاج في المنزل:

بعد مغادرتك المستشفى لن يطلب من أي فحوصات مخبرية إضافية بين الجرعات الخاصة بك.

أخبر فريق الرعاية الطبية الخاص بك على الفور إذا كنت تعاني من أي علامات من علامات العدوى، مثل:

- حمى أو قشعريرة
- سعال مستمر
- أي قروح زكام غير عادية أو قروح في الأعضاء التناسلية أو داء القوباء المنطقية (الطفح الجلدي)




كما يجب الاتصال إذا شعرت أنك لست على ما يرام أو إذا كان مرض التصلب المتعدد يزداد سوءًا لديك حيث أن الفريق الطبي سيساعدك على مراقبة المرض.

الجرعات:

من أجل ضمان الجرعات المثلى، يتم تقسيم دواء أوكريليزوماب لجرعات بمقدار 600 مجم كل 6 أشهر، تحقن داخل الوريد.

يتم تقسيم الجرعة الأولية إلى جرعتين منفصلتين من 300 مجم بفارق أسبوعين. بعد الجرعة الأولية ستحتاج فقط إلى حقنة واحدة كل 6 أشهر.



ماذا أفعل إذا فاتتني جرعة؟

اتصل بطبيبك فوراً



واظب على العلاج على النحو الموصى به...
احرص على الذهاب إلى مواعيد الجرعات. وإذا كنت
لا تستطيع الحضور في الموعد، فاطلب من فريق
الرعاية الصحية مساعدتك في تغييره

مواعيد جرعتك:

الجرعة		الجرعة	
	التاريخ		التاريخ
	موقع		موقع
	جهة الاتصال		جهة الاتصال
الجرعة		الجرعة	
	التاريخ		التاريخ
	موقع		موقع
	جهة الاتصال		جهة الاتصال

لأن الوعي وقاية

إدارة التثقيف الصحي

قسم الصيدلية السريرية