




تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster
شركة الصحة القابضة



نتاليزوماب

Natalizumab

ما هو عقار نتاليزوماب؟

عقار لعلاج مرض التصلب المتعدد "MS" وهو عبارة عن نوع من البروتين يعرف باسم الجسم المضاد وحيد النسيلة – تتشابه الأجسام المضادة وحيدة النسيلة مع الأجسام المضادة الطبيعية التي تخلقها أجهزتنا المناعية لمكافحة العدوى

كيف سيتم إعطاء عقار نتاليزوماب؟

سوف تتلقى العقار كحقنة تحت الجلد من مقدم الرعاية الخاص بك .


كيف يعمل عقار نتاليزوماب؟

عادةً ما يسمح الحاجز الدموي الدماغي بوجود بضعة خلايا مناعية في الجهاز العصبي المركزي والتي تقوم في مرض التصلب المتعدد بالهروب من النوعية الدموية واتلاف الميالين المحيط بخلايا الأعصاب.


يتسبب هذا في حدوث التهاب وظهور أعراض المرض

يرتبط العقار بالخلايا المناعية، ويمنعها من عبور حاجز الدم في الدماغ ويقلل من الأضرار التي لحقت بأعصابك
عقار نتاليزوماب هو علاج قابل للانعكاس. إذا تم إيقاف استخدامه، فستتمكن الخلايا المناعية مرة أخرى من عبور الحاجز الدموي الدماغي وقد يعود الالتهاب بمرور الوقت. لذلك، من المهم أن تستمر في تلقي عقار نتاليزوماب كما هو موصوف لك من قبل فريق علاج التصلب.

تأثير التصلب العصبي المتعدد



التأثير المحتمل للعقار



كيف يمكن لعقار نتاليزوماب أن يساعدني؟

إن تلقي عقار نتاليزوماب على النحو المنصوص عليه يقلل من عدد الانتكاسات ويبطئ التحديات الجسدية التي قد تنشأ مع مرض التصلب المتعدد. في بعض الأحيان، تكون تأثيرات نتاليزوماب تدريجية، لذلك عندما تستعيد الذاكرة لبضعة أشهر أو سنة ماضية ستلاحظ أنك تشعر بتحسن.

كشفت إحدى الدراسات أنه في المرضى الذين يعانون من التصلب

المتعدد الانتكاسي، يعمل عقار نتاليزوماب على:

- تقليل مخاطر تطور الإعاقة.

- خفض معدل الانتكاس في السنة بعد عامين من العلاج.

كما قلل عقار نتاليزوماب أيضًا من تفاقم الإعاقة بمقدار النصف

تقريبًا وقد ثبت أنه يقلل من نشاط المرض بواسطة التصوير بالرنين

المغناطيسي في دراسة أجريت للمقارنة بين عقار نتاليزوماب


والعلاج الوهمي.

يمكن أن يساعد عقار نتاليزوماب في تقليل التغييرات غير المرئية

التي تسببها التصلب العصبي المتعدد والتي تحدث تحت السطح،

حتى عندما تشعر بتحسن ويبدو أن مرض التصلب العصبي المتعدد

لديك مستقرًا.



هل يمكنني تلقي عقار نتاليزوماب إذا كنت أرغب في

إنجاب الأطفال؟

إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة أو تعتقدين أنكِ حاملاً، يجب عليكِ مناقشة هذا الأمر مع طبيبك قبل البدء في تلقي عقار نتاليزوماب كما يتوجب عليكِ إخبار طبيبك على الفور إذا كنتِ حاملاً أثناء تلقي العلاج.

ايضا، ينبغي أن تناقشي مع طبيبك ما إذا كنتِ ترغبين في القيام بالرضاعة الطبيعية أثناء فترة استخدام عقار نتاليزوماب.

هل يمكنني تناول أدوية أخرى أثناء تلقي عقار

نتاليزوماب؟

نظراً للطريقة التي يؤثر بها عقار نتاليزوماب على جهاز المناعة، يجب ألا تتلقى العقار إذا كنتِ تُعالج بأدوية أخرى للتصلب العصبي المتعدد.

من المهم أن تخبر فريق علاج التصلب العصبي المتعدد الخاص بك بأي أدوية أخرى تتلقاها للعلاج، حتى لو لم تكن مرتبطة بمرض التصلب المتعدد.

كيف يتم حقن عقار نتاليزوماب تحت الجلد؟

سوف تتلقى عقار نتاليزوماب في المستشفى أو العيادة. كحقنة تحت الجلد، من قبل أخصائي الرعاية الصحية، مرة كل أربعة أسابيع.

كيف سيبدو شكل حقنتي؟



يتم حقن عقار نتاليزوماب باستخدام حقنتين معبأة مسبقا. سيحقنك مقدم الرعاية الصحية بهذه الحقنتين على التوالي من أجل إعطائك الجرعة الكاملة.

كيف يمكنني متابعة علاجي؟

سيساعدك وضع تواريخ المواعيد في تقويمك أو دفتر يومياتك بمجرد حصولك عليها على تذكر تواريخ مواعيد زيارة الطبيب. إذا وجدت صعوبة في تذكر مواعيد زيارة الطبيب، فتحدث مع طبيبك أو ممرضة التصلب العصبي المتعدد - فقد يكون لديهما أفكارًا تُسهِّل الأمر عليك.

لقد فاتتني جرعة، ماذا يجب أن أفعل؟

إذا فاتتك حقنتك المعتادة من عقار نتاليزوماب، فينبغي عليك تحديد موعدًا جديدًا للحصول على حقنتك في أسرع وقت ممكن. يمكنك بعد ذلك الاستمرار في تلقي العلاج وفقًا للتكرار المتفق عليه.

إذا كنت ذاهبًا في عطلة، فخطط مسبقًا مع ممرضتك لإعادة تحديد موعدك.

ماذا سيحدث قبل أن أحصل على حقنتي؟

1 قبل أن تتلقى حقنك، سيُطلب منك إكمال قائمة فحص ما قبل الحقن وسيقوم طبيب أو ممرضة التطبب العصبي المتعدد ببعض الفحوصات الروتينية، ويسألك عن شعورك منذ تلقيك حقنتك الأخيرة



2 سيقوم الطبيب أو الممرضة بحقن عقار تيسابري® (نتاليزوماب) تحت الجلد، إما في الفخذ أو البطن أو الجزء الخلفي من العضد. سوف تتلقى حقنيتين، واحدة تلو الأخرى، لتلقي الجرعة الكاملة من عقار تيسابري® (نتاليزوماب)



3 يجب أن لا تستغرق عملية الحقن سوى بضع دقائق فقط



4 ستراقب الممرضة أو الطبيب حالتك لمدة ساعة تقريبًا بعد الحقن للبحث عن علامات وأعراض تفاعلات الحقن. سيعلمونك أيضًا عما يجب الإبتيا به بنفسك. يرجى اتباع إرشاداتهم



كيف يمكنني تتبع علاجي بعقار نتاليزوماب؟

سيسمح حضور المواعيد وإجراء فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي واختبارات الدم لطبيبك بمعرفة مستوى تقدمك في العلاج.

يمكن لنتائج الاختبارات أيضًا اكتشاف أي آثار جانبية يسببها عقار نتاليزوماب حتى قبل أن تشعر بالأعراض، مما يساعدك أنت وفريق التصلب العصبي المتعدد على حلها.

ماهي الفحوصات التي سأخضع لها؟

قبل بدء العلاج:

فحص التصوير بالرنين المغناطيسي، تحاليل الدم للتحقق من صحتك العامة وللتحقق مما إذا كان لديك أجسام مضادة لفيروس جون كوينغهام قبل بدء العلاج

أثناء العلاج:

تحاليل الدم لفحص الكبد، تحاليل الدم المنفصلة لمعرفة حالة فيروس جون كوينغهام كل 6 أشهر، فحوصات التصوير بالرنين

المغناطيسي الدورية لمعرفة تقدم العلاج والتحقق من وجود أي علامات تدل على اعتلال بويضات الدماغ متعدد البؤر التقدمي.

يمكن أن يزيد التعرض لفيروس جون كوينغهام من احتمالية الإصابة بعدوى دماغية نادرة تسمى اعتلال بويضات الدماغ متعدد البؤر التقدمي. ستعتمد تحاليل الدم المطلوبة على حالة فيروس جون كوينغهام لديك، وبالتالي ستختلف باختلاف الأشخاص يمكن أن يُظهر فحص التصوير بالرنين المغناطيسي العلامات المبكرة حتى قبل أن تكتشف أنت أو عائلتك / مقدمو الرعاية أي تغييرات

كم مرة سأرى فريق علاج التصلب العصبي المتعدد

الخاص بي أثناء تلقي عقار نتاليزوماب؟

يعتمد عدد المرات التي تلتقي فيها بفريق علاج التصلب العصبي المتعدد على حالتك المرضية، وعادةً ما ستلتقي بطبيبك بعد ثلاثة أشهر وستة أشهر من علاجك الأول، ثم كل ستة أشهر بعد ذلك. يمكنك أيضًا إجراء فحوصات واختبارات روتينية أخرى بين فترات

المتابعة. سترى أيضًا مقدم الرعاية الصحية أو الممرضة عندما تتلقى جرعة عقار نتاليزوماب.

ماهي الآثار الجانبية المتوقعة مع عقار نتاليزوماب؟

تشمل الآثار الجانبية الشائعة جدًا التي قد تؤثر على أكثر من 1 من كل 10 أشخاص يتلقون عقار تيسابري® (نتاليزوماب) عن طريق الحقن تحت الجلد:



إذا لاحظت أي شيء غير عادي أثناء تلقيك نتاليزوماب، سواء كنت تعتقد أنه نتيجة الدواء أم لا، فيجب عليك الاتصال بفريق التصلب العصبي المتعدد على الفور.

يرجى الرجوع إلى نشرة معلومات المريض الخاصة بعقار نتاليزوماب لمزيد من المعلومات.

ما هي أعراض اعتلال بيضاء الدماغ متعدد البؤر

التقدمي؟

الأعراض الشائعة لاعتلال بيضاء الدماغ متعدد البؤر التقدمي هي:

التغيرات السلوكية
(يمكن ملاحظتها أولاً من
قبل الأصدقاء أو العائلة أو
مقدم الرعاية)



فقدان الذاكرة المؤقت



ضعف تدريجي يؤثر على
جانب واحد من الجسم



التغيرات في الكلام
والتواصل



مشاكل في الرؤية



قد تكون أعراض اعتلال بيضاء الدماغ متعدد البؤر التقدمي مشابهة
لأعراض مرض التصلب العصبي المتعدد، لذا تابع الأعراض وتحدث
إلى طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا لاحظت أنت أو شريكك أو
مقدمو الرعاية أي تغييرات.

إذا اشتبه فريق مرض التصلب العصبي المتعدد في أنك قد أصبت
بمرض اعتلال بيضاء الدماغ متعدد البؤر التقدمي بناءً على الأعراض
و / أو أي فحوصات بالرنين المغناطيسي، فسيتم اختبارك. خلال

هذا الوقت، سيتم إيقاف العلاج الخاص بك حتى يتم التأكد من عدم إصابتك بمرض اعتلال بيضاء الدماغ متعدد البؤر التقدمي. إذا ثبت إصابتك باعتلال بيضاء الدماغ متعدد البؤر التقدمي (وهذا نادر جداً)، فسوف تتوقف عن أخذ العلاج وسيضع فريق التصلب العصبي المتعدد الخاص بك خطة للمساعدة في إدارة مرض اعتلال بيضاء الدماغ متعدد البؤر التقدمي المصممة خصيصاً لاحتياجاتك الفردية.

من المهم جداً أن تتصل بفريق مرض التصلب العصبي المتعدد إذا واجهت أي أعراض جديدة، حتى إذا كنت تعتقد أن الأعراض طفيفة أو تختفي بعد وقت قصير. يسمح التعرف على الأعراض الجديدة مبكراً لفريق التصلب العصبي المتعدد لديك بإدارة المرض بشكل أفضل وتحسين شعورك.

إذا كانت لديك أي استفسارات أخرى الرجاء التواصل مع ممرضة العيادة لربطك مع الطبيب

لأن الوعي وقاية

إدارة التشخيص الصحي

قسم الصيدلية السريرية

HEM1.25.0001724