



تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster
شركة الصحة القابضة



برنامج تطعيمات الاطفال

Immunization Program

وُضعت مواعيد جدول اللقاحات بهدف حماية الطفل قبل تعرضه للأمراض التي يمكن الوقاية منها؛ إذ تُعطى في سن مبكرة لأن الأطفال يكونون أكثر عرضة للإصابة، وقد تكون مضاعفاتها خطيرة جدًا. ولكن إذا أُخِذت في الوقت المحدد، يصبح لدى الطفل أكبر قدر ممكن من الحماية في أسرع وقت ممكن.



أثناء أخذ اللقاح:

قد يطرح الطبيب أو الممرضة بعض الأسئلة المتعلقة بصحة الطفل، مثل ما إذا كان يعاني من حساسية أو لديه أي مشاكل صحية.

الأعراض الجانبية بعد أخذ اللقاح:

غالبية الأطفال تكون حالتهم جيدة بعد تلقي اللقاح، وقد لا تظهر عليهم أي ردود فعل، أو قد يعانون من بعض الآثار الجانبية التي تختلف حسب نوع اللقاح؛ إلا أن فوائد التطعيم تفوق بكثير هذه الأعراض الخفيفة والمؤقتة، والتي غالبًا لا تستدعي علاجًا، ومن أبرزها:

- ارتفاع درجة الحرارة.
- ألم أو احمرار أو تورم حول موقع الحقن.
- النوم أكثر من المعتاد.
- الشعور بحكة في موقع الحقن.
- طفح جلدي خفيف.
- صداع.
- غثيان.
- في حالات نادرة جداً قد يظهر ردُّ فعل تحسسي شديد في غضون بضع دقائق من أخذ اللقاح.
- وكل هذه تعتبر ردود فعل طبيعية، وعادة ما تستمر بين 12 و24 ساعة.



متى تجب استشارة الطبيب؟

قبل أخذ اللقاح:

حساسية شديدة نتيجة لقاح سابق.
اضطرابات عصبية كالتشنجات أو الصرع.
يجب على من يعانون من أمراض نقص المناعة عدم تلقي اللقاح إلا بعد استشارة الطبيب.

بعد أخذ اللقاح:

- إذا كانت الأعراض الجانبية شديدة.
- إذا لم تختفِ الأعراض الجانبية.
- إذا أصيب الطفل بتشنجات بسبب ارتفاع درجة حرارته.
- إذا استمر بكاء الطفل لأكثر من 3 ساعات.
- إذا أصيب الطفل برعشة أو رجفة.
- إذا قلَّ نشاط الطفل بشكل ملحوظ.
- إذا ازداد تورم واحمرار منطقة الحقن بعد 24 ساعة.




عمر ٤ شهور

عمر شهرين

عند الولادة

الالتهاب	الالتهاب	الالتهاب الكبدي ب
الكبدى (ب)HepB	الكبدى (ب)HepB	
فيروس الروتاRV	فيروس الروتاRV	
الثلاثى	الثلاثى	
البكتيرىDTaP	البكتيرىDTaP	
المستديمة	المستديمة	
النزليةHib	النزليةHib	
العقدية الرئوية	العقدية الرئوية	
المدمجPCV	المدمجPCV	
شلل أطفال	شلل أطفال	
معطلIPV	معطلIPV	



عمر 12 شهر

عمر 9 شهور

عمر 6 شهور

العقدية الرئوية المدمج	الحصبة المفردة	السل
شلل الأطفال الفموي	الحمي الشوكية الرباعي المدمج	الالتهاب الكبدى (ب)HepB فيروس الروتاRV
الحمي الشوكية الرباعي المدمج		الثلاثي البكتيريDTaP المستديمة النزليةHib
الثلاثي الفيروسي		العقدية الرئوية المدمجPCV شلل أطفال معطل(IPV)
		شلل الأطفال الفموي

عمر 24 شهر

عمر ١٨ شهر

الالتهاب الكبدي (أ)	الثلاثي البكتيري
	المستديمة المنزلية
	شلل الأطفال الفموي
	الالتهاب الكبدي (أ)
	الجديري المائي الثلاثي الفيروسي

عمر 11 سنة عمر ١٢ سنة عمر 18 سنة

الحمي الشوكية الرباعي المدمج	فيروس الورم الحليمي	الثلاثي البكتيري
---------------------------------	------------------------	---------------------

لأن الوعي وقاية

إدارة التثقيف الصحي

قسم التوعية الصحية