





تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster
شركة الصحة القابضة



تنظير الرحم

Hysteroscopy

يمكن للفحص الشامل لبنية الحوض الداخلي للمرأة تقديم معلومات مهمة حول العقم وغيره من الاضطرابات النسائية الشائعة.



ويستخدم تنظير جوف البطن والرحم

لأغراض:


تشخيصية (الفحص فقط)

أو جراحية (الفحص والمعالجة معاً).

يستخدم أيضاً في الكشف عن المشاكل التي لا يمكن الكشف عنها عادة بالفحص الجسدي الخارجي ومن الممكن التوصية بالخضوع لأي منهم كجزء من رعاية العقم اعتماداً على وضعك الخاص.

تنظير الرحم التشخيصي

يستخدم للنظر في:



وفي حال الكشف عن أي حالة غير سويّة خلال عملية التشخيص فإنه يمكن عادة إجراء عملية باستخدام منظار جوف البطن أو الرحم لتصحيح هذه الحالة في نفس الوقت لتجنب الحاجة للخضوع لعملية أخرى.

منظار الرحم الجراحي

يمكن أن يعالج الكثير من الحالات غير الطبيعية التي يكشف عنها منظار الرحم التشخيصي، ومنظار الرحم الجراحي

يشبه منظار الرحم التشخيصي فيما عدا:

أن منظار الرحم الجراحي تُدخل أدوات دقيقة من خلال قناة إلى داخل تجويف الرحم بحيث يمكن بذلك إزالة الأورام الليفية وأنسجة الندوب والسلائل من داخل الرحم، كما يمكن تصحيح حالات الشذوذ الخلقية بواسطة منظار الرحم الجراحي مثل حالة وجود حاجز في الرحم.

قد يطلب منك طبيبك تناول أدوية لإعداد الرحم للجراحة، وفي نهاية الجراحة قد يُدخِل طبيبك أنبوب قسطرة من نوع " فوللي " أو وسيلة أخرى داخل الرحم، كما يمكن أن يصف لك مضادات حيوية و/أو إستروجين بعد أنواع معينة من جراحات الرحم لمكافحة العدوى وتنشيط عملية التئام بطانة الرحم.

إزالة بطانة الرحم:

هو إجراء يتم فيه القضاء على بطانة الرحم، ويمكن استخدامه لعلاج بعض حالات نزيف الرحم الشديد، وهو لا يجرى للنساء اللواتي يرغبن الحمل.

مخاطر منظار الرحم:

إن مضاعفات منظار الرحم تظهر في حوالي إجراءين من كل 100 إجراء من هذا النوع.

- **ثقب الرحم** أكثر المضاعفات شيوعاً (ظهور ثقب صغير في الرحم). وبالرغم من أن الثقوب عادة ما تنغلق تلقائياً إلا أنها قد تسبب نزيفاً أو تلحق ضرراً بالأعضاء المجاورة، الأمر الذي يحتم الشروع في جراحة أخرى.
- **التصاقات الرحم** أو التهاباته بعد إجراء منظار الرحم.

المضاعفات الحادة المتعلقة بالسوائل المستخدمة في

توسيع الرحم تشمل:

-  سوائل الرئة
- فرط السوائل واختلال الأملاح
-  مشاكل تجلط الدم
- ردود فعل تحسسية شديدة

وبالمقابل فإن المضاعفات الشديدة أو تلك التي تهدد حياة المريضة بالخطر غير شائعة كثيراً، وبعض المضاعفات أعلاه قد تحول دون استكمال الجراحة.

رعاية ما بعد الجراحة:

بعد إجراء منظار الرحم يمكن أن تظهر لدى المريضة بعض الإفرازات المهبلية أو نزيف أو مغص لعدة أيام، ويمكن في الغالب استئناف معظم الأنشطة البدنية خلال يوم إلى يومين من الإجراء، ويتعين عليك التأكد من طبيبك من الوقت الذي يمكنك فيه معاودة الاتصال الجنسي، وإذا ما تُرك أنبوب " فوللي " في تجويف الرحم فإنه يُزال عادة بعد بضعة أيام، كما قد يوصف لك الإستروجين لبضعة أسابيع بعد الجراحة.

لأن الوعي وقاية

إدارة التثقيف الصحي

قسم طب الإنجاب والغدد الصم والعمم

HEM2.19.000704